

Томуугийн цартахлын А(Н1N1) вирусийн
халдварын эсрэг вакцинаар дархлаажуулах
тухай

Томуугийн цартахлын А(Н1N1) вирусийн халдвараас сэргийлэх зорилгоор
ТУШААХ нь:

1.Томуугийн цартахлын А(Н1N1) вирусийн халдварын эсрэг вакцин, тариур, аюулгүй хайрцгийн хуваарийг нэгдүгээр, Вакцин тарих зааврыг хоёрдугаар хавсралтаар баталсугай.

2. Томуугийн цартахлын А(Н1N1) вирусийн халдварын эсрэг вакцинаар 6-65 насны хүн амыг сайн дураар дархлаажуулах арга хэмжээг зохион байгуулахыг Халдварт өвчин судлалын үндэсний төв (Д.Нямхүү), Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга нарт даалгасугай.

3. Уг вакцинаар дархлаажуулсан тухай мэдээ, тайланг сар бүрийн 25-ны өдрөөр тасалбар болгон Халдварт өвчин судлалын үндэсний төвд ирүүлж байхыг Аймаг, нийслэлийн эрүүл мэндийн газрын дарга нарт даалгасугай.

4.Энэхүү тушаалын хэрэгжилтэд хяналт тавьж ажиллахыг Нийгмийн эрүүл мэндийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (С.Төгсдэлгэр), Эмнэлгийн тусламжийн бодлогын хэрэгжилтийг зохицуулах газар (Ш.Энхбат)-т даалгасугай.

САЙД

С. ЛАМБАА

Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 10 дугаар сарын 26 ны өдрийн 375 тоот тушаалын нэгдүгээр хавсралт

Томуугийн цартахлын А(Н1N1) вирусийн халдварын эсрэг вакцин, тариур, аюулгүй хайрцгийн хуваарь

Д/д	Байгууллагын нэрс	Шаардагдах вакцин /хүн тун/	Шаардагдах найруулдаг тариур /5.0 мл/	Шаардагдах тариур /0.5 мл/	Шаардагдах аюулгүй хайрцаг
1	Архангай аймгийн ЭМГ	9000	990	9450	105
2	Баян-өлгий аймгийн ЭМГ	9300	1025	9770	110
3	Баянхонгор аймгийн ЭМГ	8000	880	8400	95
4	Булган аймгийн ЭМГ	5900	650	6200	70
5	Говь-Алтай аймгийн ЭМГ	5600	620	5900	70
6	Говь-Сүмбэр аймгийн ЭМГ	1400	160	1500	20
7	Дархан-Уул аймгийн ЭМГ	9100	1110	9600	110
8	Дорноговь аймгийн ЭМГ	5800	650	6150	70
9	Дорнод аймгийн ЭМГ	7400	820	7800	90
10	Дундговь аймгийн ЭМГ	4800	530	5100	60
11	Завхан аймгийн ЭМГ	7500	850	8000	90
12	Орхон аймгийн ЭМГ	10000	1150	11000	125
13	Өвөрхангай аймгийн ЭМГ	11000	1210	11600	130
14	Өмнөговь аймгийн ЭМГ	5100	570	5400	60
15	Сүхбаатар аймгийн ЭМГ	5500	610	5800	65
16	Сэлэнгэ аймгийн ЭМГ	10000	1100	10500	120
17	Төв аймгийн ЭМГ	8800	970	9300	105
18	Увс аймгийн ЭМГ	7800	860	8200	95
19	Ховд аймгийн ЭМГ	8300	930	8750	100
20	Хөвсгөл аймгийн ЭМГ	12000	1320	12600	145
21	Хэнтий аймгийн ЭМГ	7000	770	7400	90
22	Сүхбаатар аймгийн ЭМН	13350	1470	14100	160
23	Чингэлтэй дүүргийн ЭМН	14000	1560	14750	165
24	Хан - Уул дүүргийн ЭМН	9900	1150	10500	120
25	Баянгол дүүргийн ЭМН	17000	2570	17900	205
26	Сонгинохайрхан дүүргийн ЭМН	23000	2600	24200	270
27	Баянзүрх дүүргийн ЭМН	23000	2600	24200	270
28	Налайх дүүргийн ЭМН	3000	350	3150	35
29	Багануур дүүргийн ЭМН	3000	350	3150	35
30	Багахангай дүүргийн ЭМН	500	60	530	6
31	Төмөр замын эмнэлэг	1000	100	1050	11
32	Клиникийн 2 дугаар эмнэлэг	100	10	105	2
33	Зэвсэгт хүчний жанжин штабын эмнэлэг	4710	475	4950	55
34	ХӨСҮТ –ийн сайн дурын дархлаажуулалтын кабинет	1000	120	1100	13
35	ХӨСҮТ-ийн нөөцөнд	27140	3460	39600	430
36	БҮГД	300000	34650	327705	3702

Тайлбар:

Вакцины хорогдлыг 1.1 - ээр, зорилтот бүлгийг тухайн нутгийн хүн амын 10 хувиар тус тус тооцсон.

Эрүүл мэндийн сайдын 2010 оны 10 дугаар
сарын 26 ны өдрийн 375 тоот тушаалын
хоёрдугаар хавсралт

Томуугийн цартахлын А(Н1N1) вирусийн халдварын эсрэг вакциныг тарих заавар

Тодорхойлт:

Томуугийн цартахлын А(Н1N1) вирусийн халдварын эсрэг вакцин /Пандемрикс/ нь идэвхгүйжүүлсэн томуугийн сплит вирус, өндгөнд өсгөвөрлөсөн А/California/7/2009 (Н1N1)᠎а төст омгийн антиген 3.75 мкг, 5 мкг тиомерсал агуулсан.

Хэрэглэх арга, тун:

Хүүхэд, насанд хүрэгсдэд (10-аас дээш нас) 0.5 мл-ээр тарина. Вакцин хийлгэснээс хойш 3 долоо хоногийн дараа дархлаа тогтоно.

Бага насны хүүхдүүдэд (6 сараас 9 нас) 0.25 мл-ээр тарина. 3 долоо хоногийн дараа 0.25 мл-ээр 2 дах тунг тарина. Вакциныг дельтойд хэлбэрийн булчин эсвэл гуяны гадна талын булчинд тарина.

Вакциныг найруулах:

- “Пандемрикс” вакцин нь 2 тусдаа суспенз болон эмульс хэлбэрээр савлагдсан.
- Эмульс /хүчлүүр/, суспенз /антиген/-ийг холихын өмнө тасалгааны температурт 5-10 минут байлгаж, тус тусад нь сэгсрээд, бүрэн бүтэн байдлыг сайтар шалгана. Хэрвээ флакон гэмтэлтэй байвал хэрэглэхгүй.
- Хүчлүүр нь цайвар өнгөтэй, антиген нь өнгөгүй шингэн. 1 флакон 2,5 мл хүчлүүрийг 2,5 мл 1 флакон антигентэй хольж найруулахад 5 мл 10 хүн тун вакцин болно.
- Хүчлүүрийг сэгсэрсний дараа тариурт соруулан антигентэй флаконд хийнэ.
- Антиген болон хүчлүүрийг хольж сайтар сэгсэрнэ. Найруулсан вакцин нь цайвар өнгөтэй эмульс болно. Вакцины өнгө өөрчлөгдсөн тохиолдолд хэрэглэхгүй.
- Тарилга бүрийн өмнө найруулсан вакцинтай флаконыг сэгсэрч, ямар нэг өөрчлөлт орсон эсэхийг сайтар шалгана.

Эсрэг заалт:

- Вакцины найрлаганд орсон ямар нэгэн бодист (өндөг, тахианы уураг, өндөгний шар, формальдегид, гентамицин сульфат, деоксихолат сода) харшилтай хүн,

- Урьд нь ямар нэгэн вакцинд харшлын урвал, анафилактик шок өгч байсан болон хэт мэдрэг хүн.

Дархлаажуулалтын дараах урвал:

Вакциныг тарьсны дараа толгой, үе мөч, булчин өвдөх, тарьсан газар улайх, хавдах, халуурах, тунгалагийн булчирхай бага зэрэг томрох зэрэг шинж тэмдгүүд гарч болох бөгөөд 2-3 хоногийн дараа эмчилгээгүйгээр арилна. Түүнчлэн бөөлжих, тууралт гарах, толгой эргэх зэрэг шинж тэмдэг ховор тохиолдоно.

Анхааруулга:

Вакцин тарихын өмнө эмчийн үзлэг хийнэ. Шаардлагатай үед эмнэлгийн тусламж, үйлчилгээ үзүүлэх бэлэн байдлыг хангасан байна. “Пандемрикс” вакциныг бусад вакцинтай нэгэн зэрэг хийхгүй.

Хадгалах хугацаа:

Вакциныг найруулснаас хойш 6 цагийн дотор хэрэглэнэ. Найруулсан вакциныг 25-аас дээш хэмд хадгалж болохгүй.

Хадгалах хэм:

2 – 8 хэм, Вакциныг хөлдөөж болохгүй.

Вакциныг үйлдвэрлэсэн: Бельги улс, Глаксо Смит Клайн Вакцины Үйлдвэр.