


Томуу өвчний эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтэнд хэрэглэх эм



ОСЕЛЬТАМИВИР

КАПСУЛ 75МГ



Томуу өвчний эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт

Осельтамивирт мэдрэг эсвэл эмийн найрлага дах аль нэг бодит харшилтай бол хэрэглэхгүй



ТОМУУГИЙН А,В хэв шинжийн ВИРУС

Бүх насныхан хэрэглэнэ (≥3 CAP)

Дотор муухай оргих, бөөлжих, ховор тохиолдолд сэтгэц-мэдрэлийн өөрчлөлт илэрч болзошгүй

Амьтанд хийсэн нөхөн үржихүйн судалгаагаар ураг болон үр хөврөлд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй болох нь ажиглагдсан. Хүн дээр судалгаа бүрэн хийгдээгүй учир старфлю бэлдмэлийг зөвхөн жирэмсэн үед эхэд үзүүлэх эмчилгээний үр нөлөө нь урагт үзүүлэх сөрөг нөлөөнөөс илүү шаардлагатай тохиолдолд л хэрэглэнэ.

ФАРМАКОЛОГИЙН ҮЙЛДЭЛ

Томуугийн вирусын эсрэг бэлдмэл. Оселтамивирын фосфат нь томуугийн вирусын ялгаруулдаг нейроаминидаза ферментийг сонгомлоор саатуулж халдварлагдсан эсээс вирус ялгаралтыг дарангуйлах үйлдэлтэй. Томуугийн А, В хэв шинжийн вируст үйлчилнэ.

ФАРМОКИНЕТИК

Шимэгдэлт: Оселтамивир фосфат нь ууж хэрэглэсний дараа шууд ходоод гэдэсний замаар шимэгдэж элгэнд эстераза ферментийн нөлөөгөөр ихэнх хэсэг нь идэвхтэй метаболит үүсгэдэг. Идэвхтэй метаболит нь сийвэнд 30 минутын дотор орж 2-3 цагийн дараа дээд түвшинд хүрдэг.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ:

Томуугийн халдварын эмчилгээнд эмнэлзүйн шинж илэрснээс 48-72 цагийн дотор эхэлж хэрэглэнэ.

ХЭРЭГЛЭХ АРГА, ТУН:



НАСАНД ХҮРЭГЧИД

Эмчилгээ 75МГ 2 удаа
Урьдчилан сэргийлэлт өдөрт 1 удаа



ХҮҮХЭД

≥1нас	≤15кг	>15-23кг	>23-40кг
30МГ өдөрт	45МГ өдөрт	60МГ өдөрт	75МГ өдөрт
2 удаа		2 удаа	
1 удаа		1 удаа	



ХӨХҮҮЛ ХҮҮХЭД

<1 нас	<3 cap
3МГ өдөрт	3МГ өдөрт
2 удаа	2 удаа
1 удаа	шаардлагагүй

Албан ёсны дистрибьютер "Монос Трейд" ХХК
Эмийн борлуулалтын алба: 80010082, 99070492, 91116279

Томуу өвчний эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлтэнд хэрэглэх эм



ОСЕЛЬТАМИВИР



Томуу өвчний эмчилгээ, урьдчилан сэргийлэлт



Осельтамивирт мэдрэг эсвэл эмийн найрлага дах аль нэг бодит харшилтай бол хэрэглэхгүй



Амьтанд хийсэн нөхөн үржихүйн судалгаагаар ураг болон үр хөврөлд сөрөг нөлөө үзүүлдэггүй болох нь ажиглагдсан. Хүн дээр судалгаа бүрэн хийгдээгүй учир старфлю бэлдмэлийг зөвхөн жирэмсэн үед эхэд үзүүлэх эмчилгээний үр нөлөө нь урагт үзүүлэх сөрөг нөлөөнөөс илүү шаардлагатай тохиолдолд л хэрэглэнэ.



ФАРМАКОЛОГИЙН ҮЙЛДЭЛ

Томуугийн вирусын эсрэг бэлдмэл. Оселтамивирын фосфат нь томуугийн вирусын ялгаруулдаг нейроаминидаза ферментийг сонгомлоор саатуулж халдварлагдсан эсээс вирус ялгаралтыг дарангуйлах үйлдэлтэй. Томуугийн А, В хэв шинжийн вирус үйлчилнэ.

ФАРМОКИНЕТИК

Шимэгдэлт: Оселтамивир фосфат нь ууж хэрэглэсний дараа шууд ходоод гэдэсний замаар шимэгдэж элгэнд эстераза ферментийн нөлөөгөөр ихэнх хэсэг нь идэвхтэй метаболит үүсгэдэг. Идэвхтэй метаболит нь сийвэнд 30 минутын дотор орж 2-3 цагийн дараа дээд түвшинд хүрдэг.

ХЭРЭГЛЭХ ЗААЛТ:

Томуугийн халдварын эмчилгээнд эмнэлзүйн шинж илэрснээс 48-72 цагийн дотор эхэлж хэрэглэнэ.

ХЭРЭГЛЭХ АРГА, ТУН:



НАСАНД ХҮРЭГЧИД

Эмчилгээ **75МГ 2 удаа**
Урьдчилан сэргийлэлт **өдөрт 1 удаа**



ХҮҮХЭД

≥1нас	≤15кг	>15-23кг	>23-40кг
30МГ өдөрт	45МГ өдөрт	60МГ өдөрт	75МГ өдөрт
2 удаа		2 удаа	
өдөрт 1 удаа		өдөрт 1 удаа	



ХӨХҮҮЛ ХҮҮХЭД

<1 нас	<3 cap
3МГ өдөрт	3МГ өдөрт
2 удаа	2 удаа
өдөрт 1 удаа	өдөрт шаардлагагүй